

ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણ

ક્રીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિધાલય, નવસારી ખાતે રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના મોજણી અને નિગાહ આધારિત પાક રોગ જીવાત પૂર્વાનુમાન પદ્ધતિ' હેઠળ નવસારી, તાપી તેમજ સુરત જીવાતામાં પાપડીમાં લીલી ઈયળનો તેમજ મરચી અને ટામેટોના પાકમાં કોકડવા (લીફ કલી) રોગનો ઉપદ્રવ માલુમ પડેલ છે જેના નિયંત્રણ માટે ખેડૂતોને નીચે મુજબના પગલા હાથ ધરવા જણાવવામાં આવે છે.

પાપડીમાં લીલી ઈયળના નિયંત્રણ માટે:

લીલી ઈયળના ઉપદ્રવની તીવ્રતા જાણવા માટે હેક્ટર દીઠ એક પ્રકાશપિંજર અથવા ૪ થી ૫ ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા તેમજ નિયમિત રીતે પાકમાં મોજણી કરતા રહેવું.

જૈવિક નિયંત્રણ પ્રયોગશાળા, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી ખાતે કાયસોપલાની ઈયળનો ઉછેર કરવામાં આવે છે જે આ જીવાતના ઈડા તેમજ પ્રથમ અવસ્થાની ઈયળોનું ભક્ષણ કરી જીવાતના ઉપદ્રવને કાબુમાં રાખે છે. જેથી વાવણી બાદ ૪૫ દિવસથી શરૂ કરી દર અઠવાડિયે કાયસોપલાની કાર્નિયાની એક ઈયળ પ્રતિ છોડ છોડવી. ક્રીટકશાસ્ત્ર વિભાગમાં મળતા એક કાયસોપલાની કાયસોપલાના ૧૦૦ ઈડા હોય છે.

લીલી ઈયળમાં વાયરસ પેદા કરતું એચ એનપીવીનું પ્રતિ હેક્ટર ૨૫૦ લાર્વલ યુનિટ એટલે કે ૧૦ લીટર પાણીમાં ૮ થી ૧૦ મીલી વાયરસનું દ્વાવણ + ૧૦ મીલી ટીપોલ કે સેન્ડોવીટ ભેળવીને સાંજના સમયે છંટકાવ કરવાથી આ જીવાતનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ થઈ શકે છે.

વહેલી સવારે અને મોરી સાંજે મોરી અવસ્થાની ઈયળો ભેગી કરી નાશ કરવો. બેસીલસ થુરીન્જીએન્સીસ પ્રતિ હેક્ટરે ૧ કિલોગ્રામ પ્રમાણે ૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦ ગ્રામ પ્રમાણે ભેળવીને છંટકાવ કરવાથી પણ આ જીવાતને કાબુમાં રાખી શકાય છે તે ઉપરાંત લીલી ઈયળનું રાસાયણિક નિયંત્રણ કરવા માટે જંતુનાશક દવાઓ જેવીકે ઈન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫ ટકા એસસી ૫ મીલી અથવા સ્પીનોસાડ ૨.૫ ટકા ઈસી ૬ મીલી અથવા નોવાલ્યુરોન ૧૦ ટકા ઈસી ૭.૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવાથી પણ આ જીવાતના ઉપદ્રવને કાબુમાં રાખી શકાય છે.

મરચી અને ટામેટોના પાકમાં કોકડવાના નિયંત્રણ માટે :

આ રોગ સફેદ માખીથી ફેલાતો હોવાથી આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે રોપણીના ૨૦ દિવસ બાદ ડાયકલોરવોશ ૭૬ ટકા ઈસી ૫ મિ.લિ. દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી વારાફરતી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે જરૂરિયાત મુજબના છંટકાવ કરવા.

મરચીના પાકમાં શ્રિપ્સ અને કથીરીના નુકસાનથી પણ કોકડવા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં શ્રિપ્સના નિયંત્રણ માટે ટાયેઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૧૦ મીલી અથવા એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા ૪૮મીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ ટકા એસએલ ૩ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦ થી ૧૨ દિવસે વારાફરતી છંટકાવ કરવો.

પાનકથીરીના નિયંત્રણ માટે ફેનાઝાકવીન ૧૦ મીલી અથવા ડાયકોફોલ ૧૮.૫ ટકા ઈસી ૧૫ મીલી અથવા પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઈસી ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઉમેરીને છંટકાવ કરવો.

ખેતરમાંથી નીદણ અને ઘાસ ચારો કાઢી નાંખવો જેથી ખેતરની આજુ બાજુ સફેદ માખીને આશરો મળે નહીં.

વનસ્પતિજન્ય જંતુનાશકો જેવાકે લીબોળીના મીજનો ભુકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫ ટકા અર્ક) અથવા લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા એજાડીરેકટીન ૨૦ મીલી (૧ ઈસી) થી ૪૦ મીલી (૦.૧૫ ઈસી) ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રિત કરી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવો.



લીલી ઈયળ

ટામેટાનો કોકડવા (લીફ કલ્ય)