

હવામાન	ગરમ ભેજવાળુ				
જમીન	સારા નિતારવાળી, સેન્દ્રિય તત્વથી ભરપુર એવી બેસર, ગોરાડુ				
જાતો	સુરતી રવૈયા, બીલીમોરા ભડથાં, ગુજરાત શંકર રીંગણ-૧, ગુજરાત શંકર-૨ વગેરે				
રોપણી	ચોમાસુ : મે-જુન, શિયાળુ : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર, ઉનાળુ : ફેબ્રુઆરી-માર્ચ				
રોપણી અંતર	જોડીયા હાર : ૬૦ × ૬૦ × ૧૨૦ સે.મી.				
ટપક પદ્ધતિ ગોઠવણ	લેટરલ અંતર : ૧.૮૦ મી., ટપકણીયા વચ્ચેનું અંતર : ૧.૨ મી., ટપકણીયાની ક્ષમતા : ૮ લી. / કલાક				
પિયત સમયપત્રક	નવેમ્બર-જાન્યુઆરી : ૧.૨૫ - ૧.૫ કલાક, ફેબ્રુઆરી - એપ્રિલ : ૧.૫ - ૨ કલાક (એકાંતરા દિવસે)				
ખાતર	૧૫ થી ૨૦ ટન છાણીયુ ખાતર/હે. પૂર્તિ ખાતર :				
	પદ્ધતિ	રોપણી બાદ (દિવસ)	યુરીયા (કિ.ગ્રામ/હે.)	સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ (કિ.ગ્રા./હે.)	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ (કિ.ગ્રા./હે.)
	પાયામાં	---	---	૩૧૫	૮૫
	ટપક પદ્ધતિ દ્વારા (૩૦ દિવસના અંતરે ૫ સરખા હપ્તામાં)	૩૦	દરેક હપ્તે : ૩૫	---	---
આંતર ખેડ	સમયાંતરે જરૂરીયાત મુજબ				
આવરણ	૫૦% વિસ્તારમાં ૫૦ માઈક્રોન જાડાઈનું કાળુ પ્લાસ્ટીક				
પાક સંરક્ષણ	ફૂષિ યુનિવર્સિટીની વખતોવખતની ભલામણ મુજબ				
વીણી	કુમળાં ફળો નિયમિત રીતે ૨ થી ૩ દિવસના અંતરે				
આશરે ઉત્પાદન	૪૦ થી ૫૦ ટન/હે.				

